



# Determinación de secciones eficaces, masa y anchura del $K^*$ y diferencia de masas entre $K^{*0}$ y $K^{*+-}$ en la aniquilación pp a 700 y 750 MeV/c de momento del haz

Garzón Heydt, Juan Antonio

JEN,  
1977

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vNjQwODYxMg>

---

**Título:** Determinación de secciones eficaces, masa y anchura del  $K^*$  y diferencia de masas entre  $K^{*0}$  y  $K^{*+-}$  en la aniquilación pp a 700 y 750 MeV/c de momento del haz

**Editorial:** Madrid JEN 1977

**Descripción física:** 109 p 30 cm

**Copyright/Depósito Legal:** M 15736-1977

**ISBN:** 84-500-2011-5

**Materia:** Interacciones neutrón-protón Resonancias méscas Masa (Física) Reacciones de aniquilamento

**Entidades:** Junta de Energía Nuclear (Madrid) ed

**Punto acceso adicional serie-Título:** Junta de Energía Nuclear (Serie) 0081-3397 375

---

## Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- [informa@baratz.es](mailto:informa@baratz.es)

